


Centros y hospitales participantes

El proyecto cuenta con la colaboración de **11 centros** y **15 hospitales** de España.



FRCB-IDIBAPS-HCB (C1)
Hospital Universitari Vall d'Hebron / VHIR (C2)
Hospital Universitario de Cruces (C3)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (C4)
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (C5)
Institut de Recerca Biomèdica - IRB Lleida (C6)
Hospital del Mar / Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (C7)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (C8)
Hospital Universitari de Bellvitge / IDIBELL (C9)
Hospital Germans Trias i Pujol (C10)
Hospital Josep Trueta / IDIBGI (C11)
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (C12)
Hospital Universitario Ramón y Cajal / IRYCIS (C13)
Hospital Universitario Reina Sofía / IMIBIC (C14)
Hospital Universitario y Politécnico La Fe / IISLAF (C15)
Centro de Investigación del Cáncer (CIC) (B1)
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC-CERCA) (B2)
Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) (B3)
CIMA Universidad de Navarra (B4)
Institute for Research in Biomedicine (IRB) (B6)
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) (B9)
Universidad de Extremadura (UNEX) (B10)
Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau) (B11)
Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (B12)

Derivación de pacientes



Contacte con el equipo médico-investigador del proyecto a través del **formulario** habilitado en la página web del proyecto: www.aspireaecc.com

Más información



Consulte la página web del proyecto:

www.aspireaecc.com




Contacte con el **equipo médico-investigador** del proyecto:

August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute (IDIBAPS)

C/ Rosselló 149-153, 08036 Barcelona
aspirestudy@recerca.clinic.cat

ASPIRE-AECC

Investigación en hepatocarcinoma celular



fundación científica
asociación española
contra el cáncer

ASPIRE-AECC: el proyecto



A nivel institucional, el proyecto está financiado por la **Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)** en el marco del programa "Reto AECC 70% Supervivencia", y tiene una duración prevista de seis años.



El **CHC** continúa representando un **reto clínico** por: 1) ser el **tercer tumor con mayor mortalidad** a nivel mundial, 2) su **elevado riesgo de recurrencia (~50%)** después de la cirugía, y 3) su elevada incidencia (~6.500 casos diagnosticados en España).

El ensayo clínico

ASPIRE-AECC es un **estudio fase II, abierto, aleatorizado, controlado, nacional y multicéntrico**.



El **objetivo principal** de eficacia es **evaluar la supervivencia libre de recidiva (RFS)**, definida desde la aleatorización hasta la primera recurrencia documentada o la muerte por cualquier causa, evaluado dentro de una ventana de seguimiento de 2 a 5 años.

Objetivos del proyecto

Mejorar la supervivencia **del CHC resecable con alto riesgo de recurrencia**, mediante:



Un **ensayo clínico**, que evalúa una **estrategia terapéutica** perioperatoria basada en **inmunoterapia (atezolizumab + bevacizumab)**.



Líneas de **investigación traslacional** en **biomarcadores predictivos de respuesta al tratamiento y resistencia**, así como **modelos preclínicos** orientados a nuevas terapias.

Criterios de inclusión



Adultos con diagnóstico histológico de CHC en estadio BCLC A y candidatos a resección RO.



No cirróticos o cirróticos con función hepática Child-Pugh A, sin hipertensión portal clínicamente significativa (HPCS) o con HPCS pero únicamente candidatos a resección menor (<3 segmentos).



Alto riesgo de recidiva: definido por la presencia de multifocalidad, diámetro tumoral grande (>5 cm), AFP ≥ 400 ng/mL, pobre diferenciación tumoral o presencia de invasión microvascular*

* Para pacientes con tumores entre 3–5 cm, se aplicará un nomograma predefinido que indica una alta probabilidad de invasión microvascular con una puntuación >200 puntos.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

Supervivencia global, respuesta patológica mayor, respuesta patológica completa, respuesta radiológica,

tasa de resección RO, seguridad, tolerabilidad y viabilidad quirúrgica.

